

Pousse Kg MS /ha /j	Chargement Ares/UGB	Stock d'herbe disponible Kg MS/VL/j	Couverture des be- soins par le pâtu- rage Base 15,7 Kg/VL/j	Complémentation à l'auge Kg MS/VL/j
10	55	6	35%	10,2
	45	5	29%	11,2
	35	4	22%	12,2
25	55	14	88%	2,0
	45	11	72%	4,5
	35	9	56%	7,0
40	55	22	140%	0,0
	45	18	115%	0,0
	35	14	89%	1,7




Commentaire Pousse

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 28 kg MS/ha/j. On observe une forte diminution de la pousse de l'herbe, beaucoup de parcelles suivies viennent d'être fauchées, les résultats peuvent être faussés.



La pousse de l'herbe dans les Ardennes (kgMS/ha/j)



Données Météo

Somme des T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et des 10 derniers jours.
Données météo-France

Station	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
Charleville	1 044	384	6,2
Montcheutin	1 144	270	14,1
Rocroi	1 017	505	12
Saulces-Champenoises	1 181	277	9,4

300-350 °C
Mise à l'herbe

700-800°C
Fauche précoce
Début épiaison

1 200°C
Foin moyen - floraison



500-550 °C
Fin déprimage - épis 5 cm

1 000°C
Foin précoce - début floraison

1 400 °C
Foin tardif - début gainage

Des repères pour la conduite des prairies

Commentaire : (détail des bons conseils)

La pousse a fortement ralenti cette semaine, depuis le début de la campagne on observe des repousses qui tardent à arriver ça se confirme aujourd'hui derrière les dernières fauches.

Concernant **le pâturage tournant on rencontre cette même caractéristique**, le délai de retour sur un même paddock doit être parfois rallongé afin de constituer un stock d'herbe suffisant au risque d'avoir de l'herbe épié. Il faudra alors faire du topping pour faire ingérer cette herbe aux animaux.

Il est tentant de rendre les prés de fauches aux vaches. Il faut attendre au moins 21 jours après la fauche avant de le faire, et viser une hauteur d'herbe de 12-13 cm. Il faut privilégier une complémentation en fourrage pendant cette période.

Quelques tonnes distribuées sur ces 3 semaines pour ne pas à avoir à le faire durant tout l'été.

Les parcelles fauchées autour du 20 avril doivent être de nouveau récoltées, il est préférable d'assurer la qualité du fourrage. Pour celles qui n'ont pas encore été fauchées, l'herbe ne produit plus grand chose en volume si ce n'est que de durcir et de perdre en valeur alimentaire. Il ne sert à rien d'attendre, il faut préférer faucher espérant des repousses pour compenser les rendements moyens sur les fauches précoces.

Image de la semaine



Aline ROULEAU – CORNAY