


Evolution de la croissance de l'herbe dans les Ardennes



Pousse Kg MS /ha /j	Chargement Ares/UGB	Stock d'herbe disponible Kg MS/VL/j	Couverture des be- soins par le pâturage Base 15,7 Kg/VL/j	Complémentation à l'auge Kg MS/VL/j
35	65	23	145%	0,0
	55	19	123%	0,0
55	45	16	100%	0,0
	55	30	193%	0,0
75	45	25	158%	0,0
	35	19	123%	0,0
	50	38	239%	0,0
	40	30	191%	0,0
	30	23	143%	0,0





Commentaire Pousse

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 75kg MS /ha /j. Les fortes températures de la semaine passée, permettent à la pousse de l'herbe d'exploser.



La pousse de l'herbe dans les Ardennes (kgMS/ha/j)





Données Météo

Somme des T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et des 10 derniers jours.

Données météo-France

Station	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
Charleville	542	323	0,0
Montcheutin	608	192	0,2
Rocroi	493	450	0,0
Saulces-Champenoises	616	222	0,0

Commentaire : (détail des bons conseils)

La **pousse de l'herbe explose**, les températures de la semaine passée permettent à la pousse de l'herbe d'atteindre en moyenne 75 kg MS /j/ha, elle peut aller jusqu'à 140 kg en Thiérache sur une parcelle bien exposée.

Pour les parcelles en pâturage tournant, la repousse est plus rapide sur les parcelles libérées il y a 15 jours sur celles libérées plus tôt (une vingtaine de jours). Les conditions de pâturage étaient alors plus favorables au redémarrage de l'herbe.

Dans beaucoup de situations, on observe encore ponctuellement un manque d'herbe sur les premières parcelles pâturées, il ne faut pas hésiter à maintenir une part conséquente à l'auge en fonction de la situation.

Les premiers ensilages sur prairies temporaires vont arriver, l'épiaison ne devrait pas tarder. Pour les prairies permanentes, la fauche devrait avoir lieu à partir de début mai. Privilégiez autant que possible la fauche précoce pour permettre des repousses plus importantes d'ici la fin mai.

Quelques points clés à respecter pour garantir la qualité du fourrage récolté et limiter les pertes :

- **Fauchez le matin dès la disparition de la rosée** pour profiter d'un temps d'exposition maximal aux rayons du soleil.
- **Respectez une hauteur de fauche minimale de 7-8 cm !** Cela permet d'éviter que le fourrage ne soit plaqué au sol, et ainsi éviter l'incorporation de terre et donc le risque butyrique. De plus, cette hauteur de fauche facilite la reprise de pousse.
- Afin d'assurer une bonne conservation, visez un taux de **30 à 35% de MS en ensilage** de prairies permanentes ou de prairies temporaires de graminées et 40 à 45% pour des prairies de légumineuses pures. En cas **d'enrubannage**, un **taux de 50 à 60% de MS** au pressage limitera les risques sanitaires et garantira la qualité protéique du fourrage.

Les brins d'info de la semaine

Info Malgré les contraintes du confinement liées à l'épidémie de COVID-19, vos conseillers restent disponibles et joignables pour vous accompagner au quotidien et chaque semaine au travers du bulletin de l'herbe qui se poursuivra.



Fin des demandes des demandes

Calamités agricole :

Le 1^{er} juin 2020

Image de la semaine



Joël MARTIN