


Pousse Kg MS /ha /j	Chargement Ares/UGB	Stock d'herbe disponible Kg MS/VL/j	Couverture des besoins par le pâturage Base 15,7 Kg/VL/j	Complémentation à l'auge Kg MS/VL/j
60	65	39	248%	0,0
	55	33	210%	0,0
	45	27	172%	0,0
75	55	41	263%	0,0
	45	34	215%	0,0
	35	26	167%	0,0
90	50	45	287%	0,0
	40	36	229%	0,0
	30	27	172%	0,0



Commentaire Pousse

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 95 kg MS /ha /j. Les fortes températures de cette semaine font exploser la pousse de l'herbe, pour atteindre le même niveau de pousse que l'année dernière à la même période.



Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est. Chambre d'Agriculture des Ardennes, Chambre d'Agriculture de la Meuse, Ardennes Conseil Elevage.

300-360 °C
Mise à
l'herbe

700-800°C
Fauche
précoce
Début
épiaison

1 200°C
Foin moyen
- floraison



500- 650 °C
Fin
déprimage -
épis 6 cm

1 000°C
Foin
précoce -
début
floraison

1 400 °C
Foin tardif -
début
gainage

Des repères pour la conduite des prairies

Données Météo

Somme des T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie
depuis le 1^{er} janvier et des 10 derniers jours.

Données météo-France

Station	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
Charleville	616	324	1,2
Montcheutin	690	193	1,6
Rocroi	574	451	1,0
Saulces- Champenoises	703	226	3,8

Commentaire : (détail des bons conseils)

La **pousse de l'herbe explose** pour la deuxième semaine consécutive, on atteint des niveaux de pousse semblable à l'année dernière. Si le sec persiste, on peut supposer un ralentissement de la pousse dès la semaine prochaine.

Pour les parcelles en pâturage tournant, nous observons des repousses correctes après les 1^{ers} tours de pâturage, certaines parcelles pâturées fin mars atteignent aujourd'hui 10 cm de hauteur. Il est préférable d'attendre encore un peu avant un second tour, on attendra alors une hauteur d'herbe de 14 à 15 cm.

Les premiers ensilages ont commencé, et doivent se poursuivre sur les prairies temporaires. Compte tenu du stock d'herbe présent sur pied dans les prairies permanentes, soit environ 1,5 t MS /ha, et si cette dynamique de pousse persiste on peut espérer attendre encore une vingtaine de jours pour atteindre plus de 3 tMS /ha.

Quelques conseils pour réussir sa fauche précoce :

- Pour ne pas perdre trop de valeur alimentaire, il est conseillé de faucher au stade épi 10 cm. Ce stade est le compromis entre la qualité et la quantité
- Ne pas descendre en dessous 6 à 7 cm, plus bas on dégrade la capacité des repousses de la prairie, et on diminue la valeur fourragère de la récolte.
- Préférer le plus rapidement possible après la fauche, afin d'éviter la perte d'éléments solubles par respiration de la plante.
- Viser une longueur de coupe de 3 à 4 cm, pour un taux de matière sèche supérieur à 35 %, il est conseillé de réduire les brins.


Les brins d'info de la semaine

Info Malgré les contraintes du confinement liées à l'épidémie de COVID-19, vos conseillers restent disponibles et joignables pour vous accompagner au quotidien et chaque semaine au travers du bulletin de l'herbe qui se poursuivra.



Fin des demandes
Calamités Agricole :
Le 1^{er} juin 2020

Image de la semaine



A. VERMEUEN - ETREPIGNY