

Pousse Kg MS /ha /j	Chargement Ares/UGB	Stock d'herbe disponible Kg MS/VL/j	Couverture des be- soins par le pâturage Base 15,7 Kg/VL/j	Complémentation à l'auge Kg MS/VL/j
30	55	17	105%	0,0
	45	14	86%	2,2
	35	11	67%	5,2
50	55	28	175%	0,0
	45	23	143%	0,0
	35	18	111%	0,0
70	55	39	245%	0,0
	45	32	201%	0,0
	35	25	156%	0,0




Commentaire Pousse


La moyenne de pousse départementale se situe autour des 75 kg MS /ha /j. Les gelées matinales freinent la pousse tandis que dans certains secteurs le manque d'eau commence à se faire ressentir.



La pousse de l'herbe dans les Ardennes (kgMS/ha/j)



Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est. Chambre d'Agriculture des Ardennes, Chambre d'Agriculture de la Meuse, Chambre d'Agriculture de la Meuse & Ardennes Conseil Elevage.



Données Météo

Somme des T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et des 10 derniers jours.

Données météo-France

Station	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
Charleville	702	324	1,2
Montcheutin	784	193	1,6
Rocroi	669	451	1,0
Saulces-Champenoises	806	226	4

Commentaire : (détail des bons conseils)

La **pousse de l'herbe ralentit légèrement**, dans les parcelles les plus séchantes l'eau commence à manquer. Les écarts de températures encore importantes entre le matin et l'après midi ont aussi un impact négatif sur la pousse.

Pour les parcelles en pâturage tournant, l'herbe a du mal à redémarrer derrière une parcelle pâturée. Dans certains cas il faut ralentir la rotation des parcelles, les stocks d'herbe sur pieds ne sont pas forcément suffisants. La rotation peut être ralentie soit en incluant une nouvelle parcelle qui était destinée à la fauche dans le tour de pâturage, ou en maintenant la part de ration à l'auge.

Il est important de vérifier les hauteurs d'herbe en entrée et en sortie des animaux. Ne jamais descendre en dessous de 5 cm, surtout en ce moment où l'herbe peine un peu. Et viser 14 à 15 cm en entrée. Si au moment où les animaux doivent entrer sur la parcelle, l'herbe n'atteint pas cette hauteur c'est le moment de ralentir le tour, au contraire si on dépasse les 20 cm, vous pouvez exclure des parcelles du tour, pour les faucher.

L'herbe est entre le stade début montaison et début épiaison, le stade optimal pour la fauche va arriver très prochainement. Compte tenu de la météo de ces prochains jours la fauche devra attendre quelques jours afin de pouvoir récolter l'herbe dans de bonnes conditions au risque de voir la qualité diminuer.

Si les plages météo sont trop courtes, il va falloir être opportuniste et ensiler seulement en deux jours avec un fanage efficace, si le fourrage n'atteint pas 25% de MS l'ajout de conservateur sera alors obligatoire.

Derrière les 1^{ères} parcelles fauchées, réalisez le 2^{ème} apport d'engrais, afin de favoriser une bonne repousse, la pluie de cette semaine permettra de valoriser cet apport. Un apport de lisier peut être envisagé.

Les brins d'info de la semaine



Malgré les contraintes du confinement liées à l'épidémie de COVID-19, vos conseillers restent disponibles et joignables pour vous accompagner au quotidien et chaque semaine au travers du bulletin de l'herbe qui se poursuivra.



La demande d'aides bovines est à faire absolument avant le 15 mai 2020

A la semaine prochaine