



Pousse Kg MS /ha /j	Chargement Ares/UGB	Stock d'herbe disponible Kg MS/VL/j	Couverture des be- soins par le pâturage Base 15,7 Kg/VL/j	Complémenta- tion à l'auge Kg MS/VL/j
50	55	28	175%	0,0
	45	23	143%	0,0
	35	18	111%	0,0
70	55	39	245%	0,0
	45	32	201%	0,0
	35	25	156%	0,0
90	55	50	315%	0,0
	45	41	258%	0,0
	35	32	201%	0,0



Commentaire Pousse

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 95 kg MS /ha /j. La dynamique de pousse semble s'accélérer par rapport à la semaine dernière, malgré tout les températures restent bien fraîches pour une pousse optimale.





Données Météo

Somme des T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et des 10 derniers jours.

Données météo-France

Station	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
Charleville	783	369	44,9
Montcheutin	868	237	44,1
Rocroi	744	487	36,6
Saulces-Champenoises	892	261	35,2

Commentaire : (détail des bons conseils)

La **pousse de l'herbe est plus importante que la semaine passée**, les pluies de la semaine dernière ont permis d'éviter un stress hydrique à l'herbe. La pousse est répartie à la hausse dans beaucoup de secteur pour autant, elle reste limitée sur des parcelles exposées au froid.

Pour les parcelles en pâturage tournant, la situation est plus compliquée, les repousses d'herbe ont du mal à redémarrer derrière les parcelles pâturées. Sur des parcelles pâturées la semaine dernière on observe des pousses à 25 kg MS/ha/j en moyenne, on doit pouvoir espérer plus pour assurer une vitesse de rotation optimale (21 jours). Il faut ralentir la rotation, de façon à atteindre des hauteurs d'herbe correctes en entrée de parcelles.

Au-delà des hauteurs d'herbe, le stock d'herbe sur pied est un critère important.

Vous devez vous assurer que le stock d'herbe disponible sera suffisant pour couvrir les besoins en herbe

pâturée des animaux pendant au moins 15 jours, c'est ce qu'on appelle les Jours d'Avances.

Les prairies de fauches sont entre le stade gonflement et épiaison. C'est le moment de faucher pour ne pas trop perdre en qualité. Une plage de 3 jours de soleil sans pluie sera nécessaire pour récolter des fourrages de qualité, pour ceux qui n'ont pas encore fauché ce jour, cela devra être possible dès ce week-end. Même si le volume d'herbe n'est pas présent aujourd'hui, la fauche devra quand même être réalisée le semaine prochaine, ça permettra ainsi d'avoir des repousses correctes et plus tôt en saison.

Les rendements observés sur **les fauches très précoces de prairies temporaires** semblent assez faibles, cependant elles ont été réalisées un peu plus précocement qu'en 2019. Le démarrage au printemps a été plus tardif à cause d'une météo moins clémente, c'est ce qui semble avoir pénalisé le rendement de ces premières fauches.

Les brins d'info de la semaine



Pour rappel, les demandes d'aides bovines sont à faire avant le 15 mai, cette date reste inchangée !

Il est important qu'un maximum de déclaration PAC soit réalisé avant le 15 mai 2020, les premiers dossiers déposés pourront être instruits à partir de début juin.

Les déclarations faites après le 15 mai seront instruites plus tard avec un risque de non-paiement de l'acompte au 15 octobre. De plus les équipes de la DDT étant prises par ailleurs avec l'instruction des dossiers, les déclarations PAC ne pourront plus être vérifiées après leurs dépôts.

A la semaine prochaine !

Image de la semaine



Emeline LEGROUX –TOULIGNY